

## Funkcje tworzące 2

**Zadanie 1.** Wachlarzem rzędu  $n$  nazywamy graf o  $n + 1$  wierzchołkach:  $\{0, 1, \dots, n\}$  z  $2n - 1$  krawędziami zdefiniowanymi następująco: Wierzchołek 0 jest połączony z każdym innym wierzchołkiem a wierzchołek  $i$  połączony jest z  $i + 1$  dla  $i = 1, \dots, n - 1$ . Ile różnych drzew rozpinających posiada  $n$ -ty wachlarz? Wyznacz funkcję tworzącą dla rozważanego ciągu.

**Zadanie 2.** Na ile sposobów można rozmiąć banknot 100 złotowy na monety 1, 2 i 5 złotych? Podaj funkcję tworzącą dla ciągu  $p(n)$  (każdy składnik podziału wynosi 1, 2, bądź 5).

**Zadanie 3.** Znajdź funkcje tworzące dla następujących ciągów:

- (i)  $p(n \mid \text{wszystkie podziały } n)$ ,
- (ii)  $p(n \mid \text{składniki podziału są parami różne})$ ,
- (iii)  $p(n \mid \text{każdy składnik jest nieparzysty})$ ,
- (iv)  $p(n \mid \text{każdy składnik jest parzysty})$ ,
- (v)  $p(n \mid \text{każdy składnik jest ograniczony przez } m)$ ,
- (vi)  $p(n \mid \text{każdy składnik może występować co najwyżej } m \text{ razy})$ .

**Zadanie 4.** Wykorzystując metodę funkcji tworzących wykaż, że:

$$p(n \mid \text{składniki podziału są różne}) = p(n \mid \text{każdy składnik podziału jest nieparzysty}).$$

**Zadanie 5.** Niech  $e(n)$  [ $o(n)$ ] oznacza ilość podziałów  $n$  na parzystą [nieparzystą] liczbę składników parami różnych. Znajdź funkcję tworzącą dla ciągu  $e(n) - o(n)$  [zaproponuj dwa rozwiązania]. Bazując na rozwiązaniu powyższego problemu zaproponuj "szybki" algorytm zliczający ilość podziałów liczby  $n$ . Ile należy wykonać operacji dodawania, by obliczyć  $P(n)$ ?

**Zadanie 6.** Wykaż, że

$$(1 + x)(1 + x^3)(1 + x^5) \dots = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1 - x^2)(1 - x^4) \dots (1 - x^{2k})}.$$

**Zadanie 7.** Niech  $P(x)$  będzie funkcją tworzącą dla ciągu  $p(n)$ , gdzie  $p(n)$  jest ilością wszystkich podziałów  $n$ . Wykaż, że

$$P(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k^2}}{(1 - x)^2(1 - x^2)^2 \dots (1 - x^k)^2}.$$

**Zadanie 8.** Niech  $f(n)$  [ $g(n)$ ] oznaczają liczbę podziałów  $n$  z parzystą [nieparzystą] liczbą składników parzystych. Niech  $k(n)$  oznacza liczbę podziałów samosprzężonych  $n$ . Wykaż, że

$$f(n) - g(n) = k(n).$$

**Zadanie 9.** Znajdź funkcję tworzącą dla ciągu:

$$a_n = \sum_{m>0} \sum_{k_1+k_2+\dots+k_m=n, k_i>0} k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_m.$$

**Zadanie 10.** Przy ustalonym  $k \in \mathbb{N}$ , niech  $B_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^n$  będzie funkcją tworzącą dla liczb Stirlinga drugiego rodzaju  $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ . Wykaż, że

$$B_k(x) = \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdot \dots \cdot (1-kx)}.$$

Korzystając z powyższego udowodnij wzór

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{r=1}^k (-1)^{k-r} \frac{r^n}{r!(k-r)!} \text{ dla } n, k \geq 0$$

oraz

$$B_n = \frac{1}{e} \sum_{r \geq 0} \frac{r^n}{r!},$$

gdzie  $B_n$  jest  $n$ -tą liczbą Bella.

## PARĘ NOWYCH ZADAŃ

*Podział liczby  $n$  na  $k$  składników* to przedstawienie  $n$  w postaci sumy

$$a_0 + \dots + a_{k-1} = n,$$

gdzie wszystkie  $a_i \in \mathbb{N}$  oraz  $1 \leq a_0 \leq \dots \leq a_{k-1}$ .

Liczbę podziałów  $n$  na  $k$  składników oznaczamy  $P(n, k)$ . Dla  $n, k \in \mathbb{N}^+$  zachodzi

- |   |   |
|---|---|
| (i) $P(n, 1) = 1,$                            | (iv) $P(n, k) = 0,$ dla $n < k$   |
| (ii) $P(n, 2) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor,$ | (v) $\frac{1}{k!} \binom{n-1}{k-1} \leq P(n, k) \leq \binom{n-1}{k-1}.$ |
| (iii) $P(n, n) = 1,$                          |   |

*Diagram Ferrersa* dla podziału  $n = a_0 + \dots + a_{k-1}$  to tabelka składająca się z  $k$  wierszy, w której  $i$ -ty wiersz zawiera  $a_{i-1}$  elementów.

**Zadanie 11.** Udowodnij, że

- (i)  $P(n, k)$  jest równe liczbie podziałów liczby  $n$  o największym składniku równym  $k$ ;
- (ii) liczba podziałów liczby  $n$  na parami różne składniki jest równa liczbie podziałów liczby  $n$  na nieparzyste składniki;
- (iii)  $P(n+k, k)$  jest równe liczbie podziałów  $n$ , w których żaden ze składników nie przekracza  $k$ ;
- (iv) liczba podziałów *samosprzężonych* (dwa podziały są *sprzężone* jeśli ich diagramy Ferrersa są symetryczne względem "przekątnej") liczby  $n$  jest równa liczbie podziałów liczby  $n$  na parami różne składniki nieparzyste.

**Zadanie 12.** Niech  $e(n)$  i  $o(n)$  oznaczają liczbę podziałów  $n$  na parzystą, odpowiednio nieparzystą, liczbę składników parami różnych. Wykaż, że

$$e(n) - o(n) = \begin{cases} (-1)^k & \text{jeżeli } n = \frac{1}{2}(3k \pm 1), \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}$$